

Equine Pain Scale

Beteende-kategori	Poäng				
	0	1	2	3	4
Pain Face	Inget Pain Face		Pain Face	Gravt Pain Face	
Gross pain behaviour*	Inget		Av och till		Kontinuerligt
Aktivitet	Utforskande, uppmärksam mot omgivningen eller vilar	Rör sig inte		Orolig	Nedstämd
Placering i boxen	Vid dörren, tittar på omgivningen	Står i mitten av boxen med huvudet i riktning mot dörren	Står i mitten av boxen och ser åt sidan	Står i mitten av boxen med huvudet mot bakväggen eller står längst bak i boxen	
Hållning/viktfordelning	Normal hållning och normal viktfordelning	Skiftar vikten mellan benen	Spänd buk (en synlig fåra mellan bukmusklerna)	Lyfter kontinuerligt ett ben och sätter försiktigt ned det igen	Stöder inte på benet. Onormal viktfordelning/kroppshållning
Huvudposition	Äter (huvudet lågt) eller huvudet högt	Håller huvudet i nivå med manken	Håller huvudet under manken		
Uppmärksamhet på det smärtsamma området	Bryr sig inte om det smärtsamma området		Kortvarig uppmärksamhet på det smärtsamma området (ex. tittar åt buken)		Biter, buffar eller tittar på det smärtsamma området (ex tittar åt buken)
Interaktivt beteende	Tittar på betraktaren eller rör sig mot denne	Tittar på betraktaren men står stilla	Tittar inte på betraktaren eller rör sig från denna, försöker undvika kontakt	Står stilla, reagerar inte/är introvert	
Respons på foder	Äter utan någon tvekan	Tittar på fodret		Ingen respons på foder	

*"Gross pain behaviour" omfattar alla lätt synliga beteenden såsom överdrivna huvudrörelser, flemen, sparkande, skrapande med hoven, piskande med svansen, munbeteenden (tuggar, leker med tungan/läpparna osv), sträcker sig upprepa gånger.

From B Gleerup K, Lindegaard C (2015) Recognition and quantification of pain in horses: A tutorial review. *Equine Vet Education*. Gleerup et al., An equine pain face, *Veterinary Anaesthesia and Analgesia*, 2015, 42, 103-114. Illustration: Andrea Klintbjer.

Hästens Pain Face

Bedömning av hästens ansiktsuttryck bör göras utan att störa hästen. Observera hästen systematiskt, starta med öronen, sedan ögonen, nedre delen av huvudet och avsluta med en helhetsbedömning av ansiktsuttrycket. I de flesta fall ses mer än ett tecken på Pain Face när hästen har ont.

